



Genetta genetta

الاسم الشائع : الجنيت الشائع
الاسم المحلي : "قط الزباد"



البيئة

النوع :

برية

الدور في النظام البيئي :

نظراً لاعتمادها على الفواض الصغيرة كمصدر رئيسي للطاقة، من المحتمل أن تلعب هذه النوعية دوراً في السيطرة على تعداد الفواض وناقلي الأمراض المحتملين. قد تلعب أيضاً دوراً ثانوياً في انتشار البذور.

الموطن

الجنيت الشائع هو نوع منتشر، يوجد على حافة الصحراء الشمالية في المغرب والجزائر وتونس وربما ليبيا، ومن ثم في المناطق السافانية المفتوحة والجافة في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء في ثلاث كتل كبيرة، تقريباً تتوافق مع غرب أفريقيا وشرق أفريقيا وجنوب أفريقيا. كما يوجد في المناطق الساحلية من الجزيرة العربية واليمن وعمان. يميل الجنيت الشائع إلى التفضيل لجميع أنواع البيئات الغابية الخريفية والدائمة الخضرة، حيث يرتبط غالباً بالأشجار والجدال المائية، لكنه عام ويمكن العثور عليه في بيئات أخرى توجد فيها فريسة مناسبة. يتجنب البيئات المفتوحة، ولكن قد يحدث حتى في شطابيا صغيرة من الغابات في الأراضي الزراعية أو بالقرب من القرى، وعادة ما يكون غائباً عن الغابات المطيرة والغابات الكثيفة والسافانا الرطبة. ليس نادراً العثور عليه بالقرب من المباني البشرية والناس وحيواناتهم المنزلية، مما قد يكون له تأثيرات على نقل الأمراض.

أكل لحوم

الطعام



الجنيت الشائع يتغذى بشكل رئيسي على الثدييات الصغيرة، ولكنه قد يأخذ أيضاً الطيور والفقاريات الصغيرة الأخرى والحشرات والفواكه.

الحركة والتواصل



كلا الذكر والأنثى يتركان علامات رائحة في مناطقهم المألوفة. تقوم الإناث بوضع علامات على أراضيهم باستخدام غدد الروائح على جوانبهن، وساقيهن الخلفيتين، والمنطقة الشرجية. يترك الذكور علامات بتردد أقل من الإناث، غالباً عن طريق رش البول، بدلاً من استخدام غدد الروائح، ويفعلون ذلك أساساً خلال فترة التزاوج. تسمح علامات الروائح من قبل كلا الجنسين للأفراد بتحديد الوضع التكاثري والاجتماعي للجنينات الأخرى. تتميز الجنينات الشائعة أيضاً في مواقع مرضاض محددة، والتي غالباً ما تكون موجودة عند حافة أراضيهم، وتؤدي وظيفة مماثلة لعلامات الروائح الأخرى. تم الإبلاغ عن خمسة أصوات اتصال. يشير صوت الفقق إلى التفاعلات الودية، حيث يستخدمه الذكور خلال فترة التزاوج والإناث لاستدعاء الصغار. تستخدم الصغار صوت الهريرة خلال أسبوعهم الأول من الحياة، وخلال أسابيع الاعتماد، ينوحون أو ينيحون. تنمو الصغار أيضاً بعد تطور سلوك الاصطياد بالكامل وخلال التفاعلات العدوانية. وأخيراً، تصدر الجنينات صوت نقره كتهديد. تستخدم النقرات، أو، في الأفراد الأصغر سناً، التنبيق، للإشارة إلى العدوانية. يتكون السلوك التهديدي من تقوس الظهر المركزي المظلم للشعر، ووضع الظهر المقوس، وفتح الفم، وإظهار الأسنان. على الرغم من أنهم متسلقون جيدون، تقضي الجنينات الشائعة معظم وقتهم على الأرض، وتصدع الأشجار فقط للبحث عن الطعام أو للهروب من الخطر. عند المشي، يحافظون على أجسادهم قريبة من الأرض وذيولهم أفقية. للسفر على مسافات طويلة، يتبعن عادة الطرق أو مسارات الصيد أو الأودية الجافة.



Social Habits

Solitary

وحيد

العادات الاجتماعية



الجنينات هي حيوانات فردية في الغالب، على الرغم من أن مجالات الذكور والإناث قد تتداخل. الأفراد من نفس الجنس لديهم أراضي حصرية. هم حيوانات ليلية ونادراً ما يظهرون خلال النهار. يعتبرون صيادين ماهرين بشكل كبير، مثل القطط، ويقتلون بلدغة سريعة إلى الرقبة. مخالبيهم الحادة تسمح لهم بتثبيت الفريسة وتجعلهم متسلقين ممتازين.

حياة الولادة

التكاثر

تتفاوت مواسم التزاوج عبر المناطق. في غرب وشرق وجنوب أفريقيا، تتزوج الجنينات الشائعة خلال مواسم الأمطار. أما في شمال أفريقيا وأوروبا، فإنها تتزوج خلال فصلي الربيع والخريف. في مرحلة الخطوبة من التزاوج، التي لم يتم دراستها إلا في الأسر، يزيد الذكر تردد علامات رائحته بينما تقلل الأنثى من علامات رائحتها. تصل الإناث إلى النضج الجنسي عند بلوغهن سنتين وتحمل لمدة 10 إلى 11 أسبوعاً، تلد في الأشجار المجوفة أو الجحور المهجورة من واحد إلى أربعة صغار. عند الولادة، تزن صغار الجنينات من 60 إلى 85 غراماً ويكتسبون الوزن ببطء. بعد 45 يوماً من الولادة، يبدأ الصغار في تناول الطعام الصلب، على الرغم من أنهم لا يبدأون في الصيد حتى يكتملون تماماً عند عمر 18 أسبوعاً. تقدم الأم الحليب لصغارها حتى يصبحون صيادين ناجحين.

الخصائص

الوزن: الذكر من 3.5 إلى 5.0 رطل (1.6 إلى 2.3 كجم)، الأنثى من 3 إلى 5 رطل (1.4 إلى 2.3 كجم) الحجم: الذكر من 34 إلى 41 بوصة (86 إلى 105 سم) طولاً، بما في ذلك الذيل، الأنثى من 34 إلى 41 بوصة (86 إلى 105 سم) طولاً، بما في ذلك الذيل

Image(s) source :

Link(s)

Compiled By: